

DOIT-ON NOURRIR LES ABEILLES AU PRINTEMPS?



Dans notre région (moyen nord) les hivers sont longs et froids.

Bien que le nourrissage d'automne soit correct, certaines colonies ont de la difficulté à se rendre à terme. Colonies trop gourmandes, hiver trop long, printemps qui tarde à venir sont toutes des situations difficiles pour les abeilles.

La reine reprend les activités à la mi-mars. La quantité de pollen dans la ruche doit répondre aux besoins pour le nourrissage des larves. Pour sa part, la reine régule sa ponte en fonction des capacités de la ruche. Pour pallier ces manques, il est important de fournir un apport supplémentaire en sucre et en pollen. Cette période coïncide avec le moment où elles s'activent pour nourrir le couvain ce qui implique une dépense d'énergie très importante.



Le sucre favorise la ponte et fournit l'énergie nécessaire aux ouvrières.

Le « candy » est une solution pour accélérer la ponte et la colonie.



Compte-tenu que l'hiver n'est pas complètement terminé, le « candy » garantit qu'il ne manquera pas de nourriture en fin de saison à condition d'avoir une reine solide et une colonie forte. Ce n'est pas un remède pour les colonies trop faibles. Les abeilles doivent être nourries au bon moment. Advenant un printemps hâtif, les besoins en nutriments sont beaucoup moins importants.

L'addition de pollen (patties) est aussi conseillée tôt le printemps.



Les galettes Bee pro (substitut de pollen apportant aux abeilles les acides aminés, les vitamines et les protéines) servent principalement à nourrir les larves lors de leur développement. Très souvent au printemps, la disponibilité naturelle en pollen est insuffisante, à la suite des conditions météorologiques défavorables.

En fin de printemps, lorsque le gel est moins fréquent, il est suggéré de donner aux abeilles à partir de l'entrée de la ruche (nourrisseur Boardman) un sirop de sucre (sucre et eau en parts égales) afin de soutenir la reine dans sa ponte.



Ce sirop de constance liquide sera presque identique au nectar que les abeilles pourraient butiner. Il pourra être consommé immédiatement ou sera stocké en miel. Attention de ne pas trop en donner. Ce sirop ne doit pas être récolté lors de la miellée.